



# TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ

## TURKISH SOCIETY OF DERMATOLOGY

### TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ BÜLLÜ HASTALIKLAR ÇALIŞMA GRUBU

#### Covid-19 salgını ile ilgili duyurusu

İlk defa Çin’de ortaya çıkan Covid-19 (Coronavirüs) salgınının Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülkeye hızla yayılması nedeniyle immünoşüpresif ilaç kullanan pemfigus ve büllöz pemfigoid hastalarının takibi konusunda oluşan belirsizliği gidermek amacıyla bir bilgilendirme yapma gereği duyulmuştur.

Bu duyurunun amacı Türkiye Dermatoloji Derneği (TDD) Büllü Hastalıklar Çalışma Grubunun konu ile ilgili hastaları en güncel bilgiler ışığında bilgilendirmektir.

Pemfigus ve büllöz pemfigoid nedeniyle kortizon (prednol, deltacortil) ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaç (azatioprin, mikofenolat mofetil, metotreksat ve rituksimab) kullanan hastalarımız Coronavirüs enfeksiyonu açısından riskli grupta yer almaktadır. Bu nedenle karabalık ortamlardan kaçınmaları ve temizlik kurallarına riayet etmeleri oldukça önem taşımaktadır.

Coronavirüs belirtileri gelişmeden kullanılan ilaçların kesilmesi hastalığın tekrarlamasına neden olabilir. Hastalık açısından ek risk taşımayan (hasta insanlar ile yakın temas) hastalar ilaçlarını kullanmaya devam edebilir. Bu konuda çekinceleri olan hastaların takip olduğu hekim ile görüşmesi önerilir.

Pemfigus ve büllöz pemfigoid hastaları ateş, nefes darlığı, kuru öksürük gibi belirtiler gelişmesi durumunda bir sağlık kurumuna başvurmalıdır.

Kullanılan tedaviler ile belirtileriniz azalmış veya kaybolmuşsa sağlık kuruluşuna başvurmanız gerekmeyebilir. İlaç raporunuzun süresi sağlık bakanlığınca otomatik olarak uzatılmış olduğundan eczaneden reçetesiz olarak ilacınızı edinebilirsiniz. Tedaviye rağmen hastalık belirtilerinde artış var ise takip olduğunuz Dermatoloji hekimine başvurunuz.

TDD Büllü Hastalıklar Çalışma Grubu olarak Covid-19 coronavirüs enfeksiyonu ile ilgili gelişmelerden sizleri tekrar bilgilendirebiliriz.