

No	Soru	Cevap
1	Likenifikasyonun histopatolojisinde hangisi bulunmaz?	a) Akantoz b) Hiperkeratoz c) Akantoliz d) Retelerde uzama e) Spongioz
2	Kromoblastomikozaya ait klinik özelliği işaretleyiniz.	a) Merkezi skarlarla iyileşen annüler, verrüköz, granülomatöz plağa ilerleyen lezyon b) Lokal yerleşimli drene olan nodüller, sinüsler ve yumuşak doku şişliği c) Lenfatik drenaj boyunca multipl dermal ve subkutan nodül ve ülserler d) Aft benzeri ülserler, sinüsler ve köprüleşmeler e) Sert papüller, hemorajik büller, nekrotik ülserler
3	Komedon görülme yen hastalığı işaretleyiniz.	a) Akne vulgaris b) Favre-Racouchot sendromu c) Hidrodistoma d) Trikofolliküloma e) Trikostazis spinüloza
4	Topikal olarak duyarlanılan allerjen ile sistemik karşılaşma sonucu orijinal duyarlanma bölgesinde dermatit ve ilave olarak yaygın dermatit, bazen eritrodermi görülmesine ne ad verilir ?	a) Sistemik allerjik kontakt dermatit b) Kontakt ürtiker c) İritan dermatit d) Fotokontakt dermatit e) Atopik dermatit
5	Eritema nodozumda en sık rastlanan etyolojik neden nedir?	a) Üst solunum yolu infeksiyonu b) Tüberküloz c) Sarkoidoz d) İnflamatuvar barsak hastalıkları e) İlaçlar
6	Aşağıdakilerden hangisi ağızda derin ülsere neden olur?	a) Herpanjina b) El ayak ağız hastalığı c) Su çiçeği d) Sifiliz gomu e) Herpes simpleks
7	Skleroderma patogeneğinde yer alan en erken bulgu hangisidir?	a) Endotel hasarı-vasküler disfonksiyon b) Th2 tipi sitokin üretimi c) B hücresi aktivasyonu d) Fibroblast proliferasyonu e) Glukozaminoglikan sentezi
8	Vitiligonun topikal tedavinde kullanılmayan ilacı işaretleyiniz.	a) Kortikosteroidler b) Kalsinörin inhibitörleri c) Kalsipotriol d) Antralin e) Psödokatalaz
9	Ağrısız servikal lenfadenopati hangi histiositoz tipinin özelliğidir?	a) Rosai Dorfman hastalığı b) Multisentrik retikülohistiositoz c) Ksantoma disseminatum d) İndetermine hücreli histiositoz

		e) Hand-Schuller-Christian hastalığı
10	Virus latent halde iken konak savunması tarafından neden tanınmaz?	a) Hastanın immün yanıtı yetersizdir b) Reaktivasyonda viruslar sinir periferine göç edemez c) Virus latent halde viral proteinleri üretmez d) Virusun latent halde lipid zarfı bulunmaz e) Viruse karşı antikorlar gelişmez
11	Sweet sendromunda ilk seçenек tedavi ajanını işaretleyiniz.	a) Kolşisin b) Dapson c) Sistemik kortikosteroid d) GMC-SF e) İmmüsupresifler
12	Keloid ile ilgili doğru ifade hangisidir?	a) En sık yerleşim yeri yüzdür. b) Lezyon ağrılı veya kaşıntılı olabilir. c) Lezyon, orijinal yaralanma bölgesi sınırlarını aşmaz. d) Aylar/yıllar içinde kendiliğinden geriler. e) Tedavide ilk seçenек cerrahi eksizyondur.
13	Papüler purpurik eldiven çorap sendromunun etkenini işaretleyiniz.	a) Paramiksovirus b) Riketsia c) HHV-8 d) Parvovirus B 19 e) Variola virus
14	Atopik dermatite eşlik edebilen durumu işaretleyiniz.	a) İktiyozis vulgaris b) Milia c) Trikotiyodistrofi d) Trakionişi e) Pitriazis versikolor
15	Aşağıdaki cümleyi doğru olarak tamamlayan ifadeyi işaretleyiniz. "Fordyce lekesi, sebase bezlerin ..."	a) göz kapağı tarsal yüzeyine yerleşmiş şeklidir b) yanak mukozası ve dudaklara yerleşmiş şeklidir c) prepisium ve penis frenulumuna yerleşmesidir d) meme başı bölgesine yerleşmesidir e) labia minörlere ektopik yerleşimidir
16	Liken planus tedavisinde kullanılmayan ajanı işaretleyiniz.	a) PUVA b) Altın c) Metotreksat d) Antimalaryaller e) Siklosporin
17	Saçlarda kırılma/ kopmaya neden olmayan hastalık hangisidir?	a) Pili torti b) Trikoreksis invaginata c) Gevşek anagen sendromu d) Trikoreksis nodosa e) Trikoşizis
18	Lyme hastalığının ilk deri bulgusunu işaretleyiniz.	a) Eritema marginatum b) Eritema anülare sentrifigum c) Eritema migrans d) Eritema giratum repens e) Eritema multiforme
19	Sklerödem ile birlikte en sık hangi tip paraproteinemi görülür?	a) IgA b) IgD c) IgE d) IgG e) IgM

20	Topikal akne ilaçlarından hangisi Malassezia furfur tarafından üretilir?	a) Benzoil peroksit b) Azelaik asit c) İzotretinoin d) Nadifloksasin e) Tetrasiklin
21	Dama tahtası paternde parakeratoz ve akantolitik diskeratoz hangi hastalığın tipik patolojik bulgusudur?	a) Pitriazis likenoides kronika b) Pitriazis likenoides et varioliformis akuta c) Psoriasis vulgaris d) Pitriazis rubra pilaris e) Keratosis likenoides kronika
22	Bir meslek hastalığı olarak karşımıza çıkabilen mikobakteriyel hastalığı işaretleyiniz.	a) Lupus vulgaris b) Skrofuloderma c) Tuberkulozis verrukoza kutis d) Papulonekrotik tuberkülid e) Liken skrofulosorum
23	Periferik tıkaçıcı arter hastalığında en sık görülen yakınma hangisidir?	a) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve istirahat ile düzelmeyen ağrı b) Egzersizle kalça ve bacaklarda ortaya çıkan ve istirahat ile düzelen ağrı c) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle düzelen ağrı d) İstirahat halinde ortaya çıkan ve egzersizle düzelmeyen ağrı e) Egzersiz ve istirahatten bağımsız olan bacak ve kalça ağrısı
24	Kentsel tip kutanöz leishmaniasis'de etken nedir?	a) Leishmania major b) Leishmania mexicana c) Leishmania infantum d) Leishmania tropica e) Leishmania aethiopica
25	Hangisi dermatitis herpetiformis kesin tanısı için gereklidir?	a) Papiller dermiste nötrofilik infiltrasyon b) İnce barsak biopsisinde gluten-sensitif enteropati saptanması c) Papiller dermiste granüler IgA depolanması d) Semptomların dapsone ile düzelmesi e) HLA-DQ genotipinin gösterilmesi
26	Toksik epidermal nekrolizde kullanılan hangi tedavi Fas ligand'ın Fas'a bağlanmasını engelleyerek etki gösterir?	a) Kortikosteroidler b) IVIg c) Siklosporin d) Talidomid e) Siklofosamid
27	Dermatomiyoziğin deri bulguları arasında tanısız değeri en önemli olanı işaretleyiniz.	a) Poikiloderma b) Kutikular distrofi c) Periorbital ödem d) Kalsinozis kutis e) Jinjival telenjektazi
28	Laktasyon döneminde anne tarafından kullanılabilen ilacı işaretleyiniz.	a) Metotreksat b) Mikofenolat mofetil c) Azotioprin d) Hidroksiklorokin e) Siklosporin

29	Hangisi kollodyon bebeğin ayırıcı tanısına girmez ?	a) Lameller iktiyoz b) Sjögren-Larssen sendromu c) Trikotodistrofi d) İnfantil Gaucher hastalığı e) İnfantil seboreik dermatit
30	Sarkoidoz varyantlarından Darier -Roussy hastalığında hangi tip deri lezyonu görülür?	a) Subkutan nodül b) Violase plak c) Papül d) Annüler plak e) Makülopapül
31	Nekrobiozis lipoidikadaki histopatolojik bulguyu işaretleyiniz.	a) Lobuler pannikülit b) Epidermal hipertrofi c) Bazal membranda IgM, C3 depolanması d) Palizatlanan granümatöz dermatit e) Diffüz müsün depolanması
32	Bowen hastalığı için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.	a) En sık baş ve boyun bölgesinde yerleşim gösterir b) Kriyoterapi öncelikli tedavi yöntemidir c) Aktinik keratoz zemininde gelişebilir d) Human papilloma virus etyolojik faktörlerdendir e) Displastik hücreler adneks epitellerine yayılabilir
33	Sistemik isotretinoin kullanımına bağlı görülen yapısal saç anomalisini işaretleyiniz.	a) Pili torti b) Moniletriaks c) Pili annulati d) Pili multigemini e) Pili bifurkati
34	anaplarda asemptomatik bir eritemle (tokatlanmış yanak) başlayan çocukluk çağının viral hastalığını işaretleyiniz.	a) Rozeola infantum b) Kızamık c) Kızamıkçık d) Eritema Enfeksiyozum e) Kızıl
35	Hangisi eritema ab igne gelişiminde rol oynayan risk faktörü değildir ?	a) Elektrikli battaniye kullanımı b) Diz-üstü bilgisayar kullanımı c) İnfrared lambası kullanımı d) Sıcak-su torbası kullanımı e) Jakuzi kullanımı
36	Edinsel perforan dermatoz (Kyrle Hastalığı) en sık hangi tablo ile ilişkilidir?	a) Kalp yetmezliği b) Siroz c) Tüberküloz d) Böbrek yetmezliği e) Sarkoidoz
37	Alopesi areatada başlıca hangi hücrelerin infiltrasyonu görülür?	a) B-lenfositler b) T-lenfositler c) Makrofajlar d) Dendritik hücreler e) Nötrofiller
38	Yara iyileşmesi ve yara bakımı açısından yanlış ifadeyi işaretleyiniz.	a) Temiz yaralar, steril olup, sınıf 1'de yer almaktadır. b) Temiz kontamine yaralarda enfeksiyon oranı %10'dur.

		<p>c) Temiz kontamine yaralarda antibiyotik profilaksisi yapılmalıdır.</p> <p>d) Kontamine yaralar, nonpürülan akıntılı ve akıntısız yaralardır.</p> <p>e) Kontamine yaralarda enfeksiyon oranı % 20-30'dur.</p>
39	Hangisi ağırlı bir nodül örneğidir?	<p>a) Trikofoliküloma</p> <p>b) Trikoepitelyoma</p> <p>c) Kalsinosis kutis</p> <p>d) Ektrin spiradenom</p> <p>e) Kondroid siringom</p>
40	Kutanöz olmayan formlardan biri olarak sınıflandırılabilen porfiriyayı işaretleyiniz.	<p>a) Variegat porfirya</p> <p>b) Herediter koproporfirya</p> <p>c) Konjenital eritropoietik porfirya</p> <p>d) Akut intermitant porfirya</p> <p>e) Eritropoietik protoporfirya</p>
41	Angioödem görülmeyen fiziksel ürtiker tipini işaretleyiniz	<p>a) Dermografizm</p> <p>b) Soğuk ürtikeri</p> <p>c) Sıcak ürtikeri</p> <p>d) Kolinerjik ürtiker</p> <p>e) Basınç ürtikeri</p>
42	Oral lezyonlar içerisinde malignite potansiyeli en yüksek olan tablo hangisidir?	<p>a) Liken planus</p> <p>b) Darier hastalığı</p> <p>c) Lökoedema</p> <p>d) Lökoplaki</p> <p>e) Eritroplaki</p>
43	Hangi tanımlama epidermoid kist için doğrudur?	<p>a) En sık gözlenen kutanöz kistdir</p> <p>b) En sık saçlı deride yerleşir</p> <p>c) İnfantların %75'inde özellikle yüz yerleşiminde sıktır</p> <p>d) Kıl folikülünün dış kök kılıfından köken alır</p> <p>e) Lamine keratin ve çok sayıda vellüs kıl içerir</p>
44	Hangi bulgu psoriasis tırnak yatağı tutulumunu tanımlar?	<p>a) Yüksük tırnak</p> <p>b) Subungual hiperkeratoz</p> <p>c) Beau çizgileri</p> <p>d) Lökonishi</p> <p>e) Onikoreksis</p>
45	Hangisi "Nötrofilik ürtiker" in bir özelliğidir?	<p>a) Vasküler fibrin birikimi ve karyoreksis</p> <p>b) 24 saatten uzun süren ürtika plakları</p> <p>c) IgG yapısında otoantikörlerin varlığı</p> <p>d) β2 adrenerjik reseptör gen polimorfizmi</p> <p>e) Ailesel akdeniz ateşi ile birliktelik</p>
46	Pyoderma gangrenosum varyantlarından hangisinde hematolojik malignite eşlik etme riski yüksektir?	<p>a) Pyostomatitis vegetans</p> <p>b) Peristomal pyoderma gangrenosum</p> <p>c) Süperfisyel granulatöz pyoderma</p> <p>d) Büllöz pyoderma gangrenosum</p> <p>e) PAPA sendromu</p>
47	Dermatofitler ile ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz.	<p>a) Dermatofitler keratinize dokuya invaze olabilmek için keratinaz üretirler</p> <p>b) Sebumun dermatofitler üzerine inhibe edici özelliği vardır</p>

		<p>c) Antropofilik dermatofitler insandan insana bulaş gösterirler</p> <p>d) Trichophyton schoenleinii wood ışığı muayenesinde sarı refle verir</p> <p>e) Konaktaki proteaz inhibitörleri dermatofitlerin invazyonunu sınırlarlar</p>
48	Yetişkinlerde ayak tırnaklarında tinea unguium tedavi protokollerinden hangisi doğrudur?	<p>a) Terbinafin 250 mg/gün, 6 hafta</p> <p>b) Terbinafin 250 mg/gün, 9 hafta</p> <p>c) Itrakonazol 200 mg/gün, 12 hafta</p> <p>d) Itrakonazol 200 mg/gün, 6 hafta</p> <p>e) Flukonazol 200 mg/hafta, 3 ay</p>
49	Hangisi apokrin ter bezleri ile ilgili bir hastalıktır?	<p>a) Granulozis rubra nasi</p> <p>b) Riley-Day sendromu</p> <p>c) Ross sendromu</p> <p>d) Frey dendromu</p> <p>e) Fox-Fordyce hastalığı</p>
50	<i>Phthirus pubis</i> 'in yol açtığı kirpik bitlenmesi tedavisinde kullanılan vazelin günde kaç kez ve ne kadar süre uygulanmalıdır ?	<p>a) Günde 1 kez, 1 gün</p> <p>b) Günde 2 kez, 1 gün</p> <p>c) Günde 1 kez, 2 gün</p> <p>d) Günde 1 kez, 5 gün</p> <p>e) Günde 2 kez, 8 gün</p>
51	Mukoza tutulumu görülen psoriasis formu hangisidir?	<p>a) Guttat psoriasis</p> <p>b) İvers psoriasis</p> <p>c) Püstüler psoriasis</p> <p>d) Psoriatik eritroderma</p> <p>e) Psoriasis vulgaris</p>
52	Darbant ultraviyole B fototerapi ile ilgili yanlış ifadeyi işaretleyiniz.	<p>a) En yüksek 311 nm en düşük 305 nm ışık salınımı yapan TL-01 lambaları kullanılır</p> <p>b) Tedavi dozları minimal fototoksik doza (MPD) göre belirlenir</p> <p>c) Maksimum etki için hafif bir eritem gereklidir</p> <p>d) Uygulama öncesi nemlendirici kullanımı tedavi etkinliğini artırır</p> <p>e) Katran, antralin, topikal steroidler ve kalsipotriol ile kombine kullanılabilir</p>
53	Oral pemfigus vulgarisin duyarlılığı en yüksek tanı aracı hangisidir?	<p>a) Dsg3-ELİSA</p> <p>b) İndirek immüno Floresan</p> <p>c) Histopatoloji</p> <p>d) Tzanck testi</p> <p>e) Nikolsky belirtisi</p>
54	SALT (Skin Associated Lymphoid Tissue), DMU (Dermal Microvascular Unit), DIS (Dermal Immune System), ve SIS (Skin Immune System)'in tümünde ortak bulunan hücre hangisidir?	<p>a) Langerhans hücreleri</p> <p>b) Dermal T hücreleri</p> <p>c) Doku dentritik hücreleri</p> <p>d) Vasküler endotel hücreleri</p> <p>e) Mast hücreleri</p>
55	Merkezi kısmında sert konik bir uzantı ve çevresinde	<p>a) Klavus</p> <p>b) Kallus</p>

	hiperkeratoz bulunan, mekanik nedenlerle ortaya çıkan ve bası ile ağrıya yol açan keratotik papüllerin spesifik adı nedir?	<ul style="list-style-type: none"> c) Yağ fitiği d) Dekubitus ülserasyonu e) Liken simpleks kronikus
56	Yüksek α -protriptaz düzeyleri hangisinde saptanır?	<ul style="list-style-type: none"> a) Nodüler mastositoz b) Telenjiyektazy makülaris erüptiva perstans c) Mast hücreli lösemi d) Ürtikerya pigmentosa e) Difüz kutanöz mastositoz
57	Epidermodisplazia verrusiformis hastalarında en sık hangi HPV tipleri saptanır?	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 ve 8 b) 3 ve 10 c) 13 ve 32 d) 16 ve 18 e) 27 ve 57
58	Sifilizli, HIV pozitif kişilerde BOS tetkikleri normale hangi tedavi şeması uygulanır?	<ul style="list-style-type: none"> a) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ tek doz b) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 3 kez c) Benzatin penisilin G, i.m., 2.4 MÜ bir hafta ara ile 6 kez d) Kristalize penisilin G, i.v., 3-4 MÜ 4 saatte bir 10-14 gün e) Prokain penisilin G, i.m., 2.4 MÜ günde bir kez 10-14 gün
59	Hangisi lokalize kutanöz layşmanyaziste sistemik tedavi endikasyonları arasında yer almaz?	<ul style="list-style-type: none"> a) Hastanın immünsüprese olması b) Mukokütanöz hastalığın eşlik etmesi c) Kolda 2 cm çaplı nodüler lezyon olması d) Rezidivan formun gelişmesi e) Sporotrikoid formun gelişmesi
60	Deride ayrışma alanlarının yüzdelerinden hangisi Stevens-Johnson Sendromu - Toksik Epidermal Nekroliz overlap tanısı için uygundur?	<ul style="list-style-type: none"> a) 5 b) 15 c) 35 d) 45 e) 70
61	Erizipel için doğru ifadeyi işaretleyiniz.	<ul style="list-style-type: none"> a) Ortalama 15 günlük bir inkübasyon süresi vardır b) Yeni doğarlarda en önemli etken grup C streptokoklardır. c) Perifere doğru ilerleyen lezyonun kenarları belirsizleşir. d) Şiddetli tutulumda vezikül ve büller gözlenir. e) Histopatolojide trombüs oluşumu ve lökositoklazi izlenir.
62	Perianal selülit için yanlış ifadeyi işaretleyiniz.	<ul style="list-style-type: none"> a) Streptococcus pyogenes ile gelişir b) Dört yaş altında daha olağandır c) Sistemik semptomlar her zaman eşlik eder. d) Ağrılı defekasyon, kanlı gaita yakınmaları olabilir.

		e) Deriden alınan kültür tanı ve tedavi için yararlıdır.
63	Hangisi yumuşak şankir için doğrudur?	a) İnkübasyon periyodu 1-30 gündür. b) Ağrısız, dekole ülserler karakteristiktir. c) Ülser zemininde granülasyon dokusu gelişimi iyidir. d) Gelişen adenit sıklıkla bilateraldir. e) Erken tedavi verilse bile bubo süpürasyonu olabilir
64	Hangisi fakomatozis pigmentokeratotikanın bulgularındandır?	a) Sebace nevus, serebral anomaliler b) Epidermal nevus, katarakt c) Organoid sebace nevus, benekli lentiginöz nevus d) Epidermal nevus, Becker nevus e) Epidermal nevus, vasküler malformasyonlar
65	Yüksek doz ve uzun süreli kullanımı steriliteye yol açabilen ilacı işaretleyiniz.	a) Antimalaryaller b) Siklofosamid c) Asitretin d) Takrolimus e) Azatioprin
66	Filagrin ekspresyon bozukluğu olan iktiyoz formunu işaretleyiniz.	a) Epidermolitik hiperkeratoz b) X'e bağlı iktiyozis c) İktiyozis vulgaris d) Lameller iktiyozis e) Konjenital iktiyoziform eritroderma
67	Yaygın ve tedaviye dirençli seboreik dermatit hangisinin önemli bir deri bulgusudur?	a) Parkinson hastalığı b) HBV enfeksiyonu c) Tip I diabetes mellitus d) Tip II diabetes mellitus e) Hipotiroidi
68	Erizipeloid için temel bulaşma yolu hangisidir?	a) Toprakla temas b) Doğrudan kişiden kişiye temas c) Kediyle temas, ısırma veya tırmalama d) Çiğ balık ve et ile temas e) İnhalasyon yoluyla
69	Topikal retinoidlerden hangisi kütanöz T hücreli lenfoma tedavisinde kullanılmaktadır?	a) Adapalen b) Tretinoin c) Tazaroten d) Beksaroten e) İzotretinoin
70	Kaposi sarkomunun tedavisinde kullanılan topikal retinoidi işaretleyiniz.	a) Tretinoin b) Alitretinoin c) Adapalen d) Tazaroten e) Beksaroten

71	Papillon-Lefèvre Sendromu tedavisinde hangisi kullanılmaz ?	a) Asitretin b) Etreinat c) Metotreksat d) Topikal keratolitikler e) Siklosporin
72	Marjolin ülser tanımı için doğru ifadeyi işaretleyiniz.	a) Venöz yetmezlikli olgularda gözlenen kronik bacak ülseri b) Lepralı olgularda gözlenen ülsere lezyon c) Skar dokusu üzerinde gelişen skuamöz hücreli kanser d) hücreli kanserde gözlenen ülser e) Kaposi sarkomunun AIDS'li olgularda görülen formu
73	Psikojenik kaşıntının tipik özelliğini işaretleyiniz.	a) Günlük aktiviteler sırasında artar b) Geceleri vücut ısısının artmasıyla şiddetlenir c) Lezyonlar elle ulaşılabilen yerlere sınırlıdır d) Lezyonlar unilaterale dağılım gösterir e) En sık yüz bölgesinde tutulum izlenir
74	Notaljia parestetika ile ilgili doğru ifadeyi işaretleyiniz.	a) En sık lomber dermatomlarda izlenir b) Genellikle bilateraldir c) Sinire bası yapan hareketlerle tetiklenebilir d) Dokunmakla hassas papüllerle karakterizedir e) Tedavide topikal beksaroten kullanılır
75	Hangisi Pitiriazis rosea etyopatogenezinde yer alır?	a) Human herpes virüs 6 (HHV-6) b) İnsan immün yetmezlik virüsü (HIV) c) Epstein Barr virüsü (EBV) d) Hepatit B virüsü (HBV) e) Hepatit C virüsü (HCV)
76	Baldırında 2 cm çaplı ortası ülsere viyolese eritemli nodüler lezyon bulunan, ve özgeçmişinde 1 yıl önce akciğer tüberkülozu tanısı ile tedavi gördüğü öğrenilen orta yaşlı bayan olgu için tanı nedir?	a) Sitofajik histiyositik pannikulit b) Eritema nodozum c) Alfa-1 antitripsin panniküliti d) Soğuk pannikuliti e) Eritema induratum
77	İkinci derece yüzeysel termal yanık için en uygun ifadeyi işaretleyiniz.	a) Yüzeysel dokularda transüstasyona bağlı ödem, bazen vezikülasyon, iyileşme hızlı, skarsız b) Tüm katlarıyla deri, subkutan doku ve alttaki tendonlarda etkilenme, iyileşme greft gerektirir c) Tüm katlarıyla deri ve subkutan doku hasarı, ülser oluşumu, iyileşme greft gerektirir d) Epidermal deskuamasyonla sonlanan eritem, ağrı ve lokal ısı artışı, iyileşme hızlı, skarsız e) Retiküler dermise kadar etkilenme, renk soluk, ağrısız, skarlarla iyileşir

78	Tüberosklerozda görülen tırnak tümörü hangisidir?	a) Subungual eksoztozis b) Miksoid kist c) Fibrom d) Glomus tümörü e) Onikomatrikoma
79	Grover Hastalığına histopatolojik olarak benzemeyen hastalığı işaretleyiniz.	a) Darier Hastalığı b) Pemfigus vulgaris c) Pemfigus Foliaceus d) Dermatitis Herpetiformis e) Hailey-Hailey Hastalığı
80	Periferel nöropatiye neden olan ilacı işaretleyiniz.	a) Dapson b) Hidroksiklorokin c) Metotreksat d) Mikofenolat mofetil e) Azathioprin
81	Rozaseanın klinik özellikleri arasında yer almayan hangisidir?	a) Foliküler tıkaçlar b) Papül ve püstüller c) Kalıcı eritem d) Telenjektazi e) Fimatöz değişiklikler
82	Dishidrotik ekzemada lezyonlar nerede gözlenir?	a) El, ayak ve parmak dorsallerinde b) El, ayak ve parmak laterallerinde c) Kol ve bacak ekstensör yüzlerde d) Kol ve bacak fleksör yüzlerde e) Skalp ve yüzde
83	Aşağıdaki sistemik tedavi ajanlarının hangisinin kullanımı sonrasında generalize numuler dermatit gelişimi bildirilmiştir?	a) Ribavirin b) Asitretin c) Metotreksat d) İntravenöz immunglobulin e) Takrolimus
84	Hangisi Behçet hastalığı sistemik tutulumları arasında yer almamaktadır?	a) Artrit b) Miyokardit c) Glomerulonefrit d) Üveit e) Osteomyelit
85	Minoksidilin etki mekanizmalarından hangisi saç büyümesinin stimülasyonunda rol oynamaz?	a) Telogen fazda prematür sonlanma yapar. b) Anagen fazı uzatır. c) Vasküler endotelial büyüme faktörünü artırır. d) Vasküler düz kasta gevşemeye neden olur. e) Prostaglandin sentezini artırır.

86	Primer kutanöz B hücreli lenfomaların tedavisinde hangisi yer almaz?	a) Lokal radyoterapi b) Cerrahi eksizyon c) İnterferon - α -2a d) CHOP + Rituksimab e) Beksaroten
87	Yüzeyel Bazal hücreli karsinoma en sık nereye tutar?	a) Gövde ve ekstremiteler b) Saçlı deri c) Yüz bölgesi d) El ve ayaklar e) Tırnaklar ve çevresi
88	Ektimanın klinik özellikleriyle ilgili olarak hangisi yanlıştır?	a) Lezyonlar en sık alt ekstremitelerde. b) Çocuk ve genç yaşta olmak risk faktörüdür. c) Sistemik semptomlar ve bakteriyemi siktir. d) Lezyonlar yavaş ve skarla iyileşir. e) Vaskülitlerle ayırıcı tanıya girer.
89	Hangi hastalık özellikle fleksural alanlarda retiküler hiperpigmentasyonla birlikte komedon benzeri papül ve skar oluşumu ile karakterizedir?	a) Gall-Galli hastalığı b) Diskeratozis konjenita c) X'e bağlı retiküler pigmentasyon d) Dowling-Degos hastalığı e) Dermatopati pigmentoza retikularis
90	Hangisi miks bağ dokusu hastalığında en sık görülen dermatolojik bulgulardandır?	a) Eritema nodozum b) Kapillerit c) Alopesi d) Raynaud fenomeni e) Eritema multiforme
91	Lazer epilasyonda en başarılı sonuç hangi hasta grubunda alınır?	a) Açık renk ten-- koyu renk kıl yapısı b) Açık renk ten--açık renk kıl yapısı c) Koyu renk ten--açık renk kıl yapısı d) Koyu renk ten--koyu renk kıl yapısı e) Açık renk ten-- Gri saç
92	Kawasaki hastalığında en sık tutulan arter hangisidir?	a) Koroner arterler b) Derinin yüzeyel arterleri c) Temporal arterler d) Hepatik arterler e) Renal arterler
93	Yüz ve göğüs ön yüzünde kirli sarı-kırmızı sert papüller, el ve ayak tabanlarında punktat keratoz ve tırnaklarda "V" şeklinde çentiklenme olan 20 yaşında erkek olguda tanı nedir?	a) Darier Hastalığı b) Hailey-Hailey Hastalığı c) Diskeratozis konjenita d) Werner Sendromu e) Degos hastalığı

94	Mikozis fungoides klinik görünüşlerinden hangisi sıklıkla çocuk ve gençlerde gözlenir?	a) Pigmente purpura benzeri b) Hipopigmente c) Folikülotropik d) Granülomatöz gevşek deri e) Poikiloderma vaskülare atrofikans
95	Primer Raynaud fenomeni tanı kriterleri arasında yer almayan işaretleyiniz.	a) Ekstremitelerde epizodik olarak gelişen siyanoz b) Simetrik veya bilateral tutulum c) Periferik arteryal oklüzyon bulgularının olması d) İmmunolojik anomalilerin olmaması e) Normal tırnak yatağı kapillerleri
96	Hangisi akral melanositik lezyon için malign dermoskopik paternlerdendir?	a) Paralel vadi paterni b) Kafes benzeri patern c) Paralel tepe paterni d) Fibriler patern e) Psodopigment ağı
97	Melanom metastazı için en önemli risk faktörü hangisidir?	a) Ülserasyon b) İnvazyon derinliği c) Vertikal büyüme fazında olması d) Nodüler melanom olması e) Ailede metastatik melanomlu birey olması
98	LEOPARD sendromunun bileşeni olmayan hangisidir?	a) Lentigo b) EKG değişiklikleri c) Okuler hipertolarizm d) Pulmoner anevrizma e) Büyüme geriliği
99	Aşağıdakilerden hangisi ilaçla ilişkili Sweet Sendromu tanı kriterlerinden değildir ?	a) İlaç kesilmesinden sonra lezyonun gerilemesi b) Ateş > 38 °C c) Lökositoz d) Histopatolojik olarak vaskülit bulunmaksızın dermal nötrofilik infiltratın bulunması e) Ağrılı eritemli plak ve nodüller
100	Aşağıdaki ilaç döküntülerinin hangisinde ilaç alımından aylar sonra döküntü başlayabilir?	a) Psoriasiform ilaç reaksiyonu b) Pitriyazis rozea benzeri ilaç reaksiyonu c) Eritema nodozum benzeri ilaç reaksiyonu d) Seboreik dermatit benzeri ilaç reaksiyonu e) Likenoid ilaç reaksiyonu