





KENDİMİZİ SINAYALIM

Dr. Mustafa Turhan Şahin





Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi,
Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı,
Manisa /Türkiye

1. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi / hangileri melanositiktir?



- a) A, B, C
- b) A, C, D
- c) B, C, D
- d) A, D
- e) A, C

1. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi / hangileri melanositiktir?







- a) A, B, C
- b) A, C, D
- c) **B, C, D**
- d) A, D
- e) A, C

MELANOSİTİK LEZYONLARDA GÖRÜLEN DERMOSKOPIK YAPILAR




- Pigment ağı, psödo-ağ, paralel patern
- Işınsal yapılar, psödopodlar
- Dallanmış ışınsal yapılar
- Noktalar, Globüller
- Kaldırımtaş globüller
- Lekeler (Blotch)
- Hipopigmente / depigmente yapısız alanlar
- Mavi-beyazımsı tül
- Regresyon, serpilmiş karabiber
- Vasküler yapılar (beyazımsı-kırmızı alanlar, damarlar)

2. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi / hangileri non-melanositiktir?



- a) A, B, C
- b) A, C, D
- c) B, C, D
- d) A, D
- e) A, C


2. Aşağıdaki lezyonlardan hangisi / hangileri non-melanositiktir?




- a) A, B, C
- b) A, C, D
- c) B, C, D
- d) **A, D**
- e) A, C

NONMELANOSİTİK LEZYONLARDA GÖRÜLEN DERMOSKOPİK YAPILAR

- Milia benzeri kistler:
İntraenidermal keratin



- Komedon benzeri
acıklıklar:



NONMELANOSİTİK LEZYONLARDA GÖRÜLEN DERMOSKOPİK YAPILAR

- Kırmızı lakünler:




- Ekzofitik papillar yapı:




NONMELANOSİTİK LEZYONLARDA GÖRÜLEN DERMOSKOPİK YAPILAR

- Yaprak benzeri yapılar:




3. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern izlenmektedir?




- a) Retiküler
- b) Globuler
- c) Homojen
- d) Patlayan yıldız
- e) Multikomponent

3. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern izlenmektedir?



- a) Retiküler
- b) Globuler
- c) Homojen
- d) Patlayan yıldız
- e) **Multikomponent**




GLOBAL PATERNLER


- Retiküler patern
- Globüler patern
- Kaldırımtaş1 paterni
- Homojen patern
- Patlayan yıldız paterni
- Paralel patern
- **Multikomponent patern**
- Non-spesifik patern

MULTİKOMPONENT PATTERN

- Aynı lezyonda ≥ 3 dermoskopik yapının bir arada bulunması
- MM (Yüksek oranda şüphe!): Atipik / düzensiz ve asimetrik dağılım gösteren yapılar
- Benign MN: Simetrik dağılımı gösteren santral globuller, periferik retikülasyon, ve noktalar
- BCC
- Seboreik keratoz
- Angiokeratoma




4. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern izlenmektedir?



- a) Retiküler
- b) Globuler
- c) Homojen
- d) Patlayan yıldız
- e) Multikomponent


4. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern izlenmektedir?






- a) **Retiküler**
- b) Globuler
- c) Homojen
- d) Patlayan yıldız
- e) Multikomponent

RETİKÜLER PATERN


- MN'lerde en sık görülen patern
- Lezyonun tamama yakınınını ağ yapısı oluşturur
- Tipik ve atipik pigmente ağ yapısı
 - MN
 - MM
 - Lentigo simpleks
 - Clark nevus
 - Erken Seb K
 - Dermatofibroma



RETİKÜLER PATTERN



Tipik pigment ağı



Atipik pigment ağı

5. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern / paternler vardır?



- a) Retiküler
- b) Retiküler-globuler
- c) Homojen
- d) Retiküler-homojen
- e) Globuler

5. Aşağıdaki lezyonda Patern Analizindeki hangi global patern / paternler vardır?




- a) Retiküler
- b) **Retiküler-globuler**
- c) Homojen
- d) Retiküler-homojen
- e) Globuler

RETİKÜLER-GLOBÜLER TİP DN

- Bu kombinasyon %15 DN'de görülür
- Bu tipin önemi:
Globüller periferde halka şeklinde dizilirse, nevusun büyümekte olduğunun göstergesidir



6. Aşağıdaki lezyonun dermoskopik tanısı hangisi olabilir?



- a) Displastik nevus
- b) Malign melanom
- c) Spitz nevus
- d) Liken Planus Benzeri K.
- e) Seboreik keratoz

6. Aşağıdaki lezyonun dermoskopik tanısı hangisi olabilir?




- a) Displastik nevus
- b) **Malign melanom**
- c) Spitz nevus
- d) Liken planus benzeri keratoz
- e) Pigmente aktinik keratoz

MELANOSİTİK LEZYONLARDA GÖRÜLEN DERMOSKOPIK YAPILAR

- **Pigment ağı**, psödo-ağ, paralel patern
- Işınsal yapılar, psödopodlar
- **Dallanmış ışınsal yapılar**
- **Noktalar, Globüller**
- Kaldırımtaş globüller
- **Lekeler** (Blotch)
- Hipopigmente / depigmente yapısız alanlar
- **Mavi-beyazımsı tül**
- **Regresyon, serpilmiş karabiber**
- Vasküler yapılar (beyazımsı-kırmızı alanlar, damarlar)


IŞINSAL YAPILAR




- Radyal uzanan yapılar ve psödopodlar, Melanomun radyal büyüme fazının farklı morfolojik görünümüdür
- Aynı histopatolojik korelasyon nedeniyle, “Işınsal yapılar” terimi herikisi için de kullanılır
- Psödopodlar, yoğun pigment kenarların, kıvrım yapan parmak benzeri periferik uzantılarıdır
- Düzenli, radyal, simetrik → Reed nevus
- Düzensiz, asimetrik → MM

LEKE (BLOTCH)


- Alttaki yapıların üzerini örten, lokalize veya difüz pigmentasyon
- Renk olarak siyah, kahverengi, ve/veya gridirler
- Lokalize düzenli ve difüz düzenli → Benign MN
- Lokalize düzensiz ve difüz düzensiz → MM





MAVİ-BEYAZIMSİ TÜL




- Düzensiz, buzlu cam gibi, mavimsi-beyazımsı pigmentasyon
- Tüm lezyonu kaplamaz
- MM'lerde, regresyon alanlarının üzerini örter tarzda bulunur
- Kompakt ortokeratoz ve belirgin hipergranüloz
- MM
- Spitz/ Reed nevus



REGRESYON




- MM'de regresyonun iki ana özelliği: fibrozis ve melanozis
- Beyaz alanlar fibrozisi gösterir → Skarbenzeri alanlar
- Mavi alanlar melanozisi yansıtır → Serpilmiş karabiber (multipl mavi-gri noktalar)
- Benign lezyonlarda regresyon çok nadirdir
- Serpilmiş karabiberin görüldüğü durumlar :
 - Lichen planus-benzeri keratoz
 - Pigmente aktinik keratoz

7. Aşağıdaki damar yapısı örneği-tanı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?




- a) Arborizan- E
- b) Virgül- B
- c) Glomerüler-A
- d) Firkete- C
- e) Noktasal- D


7. Aşağıdaki damar yapısı örneği-tanı eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?




- a) Arborizan- E
- b) Virgül- B
- c) Glomerüler-A
- d) **Firkete- C**
- e) Noktasal- D



VASKÜLER YAPILAR



- **Virgül benzeri damarlar:** Virgül andırır → MN (Dermal nevus)
- **Taç damarlar:** Tümör periferinde radyal dizilimli damarlar, merkezde sarı renkli globuller → Sebase hipoplazi
- **Arborizan damarlar:** Ağaç dalları benzeyen damarlar → BCC, MM,




VASKÜLER YAPILAR

- **Firkete damarlar:** Firketeye benzer damarlar. İnce ve hipopigmente halde olduğunda → Seb K, Keratinizan Tumor




Düzensiz ve kalın olduğunda → M

- **Noktasal damarlar:** Topluğne bası benzeyen minik damar yapıları. Ve damarlar → MM, Spitz, SCC, psori



- **Lineer düzensiz damarlar** → MM



- **Regresyon alanı damarları** → Regressive MM



INTERNATIONAL
SOCIETY *of*
DERMATOLOGY

14th Aegean Dermatology Days

Regional Meeting of the
International Society of Dermatology

Bodrum Hilton Türkbükü
1-5 May, 2019

www.egedermatoloji2019.org



14. EGE DERMATOLOJİ GÜNLERİ

BODRUM HILTON
1-5 MAYIS 2019



www.egedermatoloji2019.org • www.serenas.com.tr

Teşekkürler...